


SI CES SYMPTÔMES  
SONT PRÉSENTS,  
CONSULTEZ POUR  
DES EXAMENS  
COMPLÉMENTAIRES



## CANCER DE L'ENFANT SIGNES D'ALERTE

SIGNES ET SYMPTÔMES		DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL		CANCER SUSPECTÉ	
Anémie	Infection	Leucémie			
Hématomes	Troubles de la coagulation, anomalies plaquettaires, défaillance de la moëlle osseuse	Leucémie			
Adénopathie	Infection	Lymphome de Burkitt(LB) Lymphome non hodgkinien (LNH) Lymphome de Hodgkin(LH)			
Masse abdominale	Désordres nutritionnels, kyste rénal, constipation, kyste ovarien, hépatosplénomégalie, hémoglobinopathie, tuberculose rénale	Tumeur de Wilms (néphroblastome), LNH, rhabdomyosarcome vésical, neuroblastome			
Masse médiastinale et dyspnée	Infection	Lymphome Neuroblastome			
Pupille blanche (leucocorie)	Cataracte congénitale	Rétinoblastome			
Céphalée, vomissements matinaux, ataxie, troubles de la vision, paralysies	Migraine, sinusite, méningite si fièvre associée (infection)	Tumeur cérébrale			
Douleur osseuse, tuméfaction du bras ou de la jambe sans traumatisme ou infection	Kyste osseux, ostéomyélite	Tumeur osseuse			

# CANCER DE L'ENFANT

## SIGNES D'ALERTE



SI CES SYMPTÔMES SONT PRÉSENTS, CONSULTEZ POUR DES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

1



Pâleur, ecchymoses ou saignements, douleurs osseuses diffuses

2



Masse ou tuméfaction - indolore sans fièvre ou autres signes infectieux

3



Perte de poids ou fièvre inexpliquée, toux persistante ou dyspnée, sueurs nocturnes

4



Modifications au niveau de l'oeil - pupille blanche, strabisme récent, perte de vision, hématome ou tumeur périoculaire

5



Masse abdominale

6



Céphalées, sévères ou inhabituellement persistantes, vomissements (matinaux ou empirant au cours de la journée)

7



Douleur de membres ou douleur osseuse, tuméfaction sans fièvre ou signes infectieux

8



Fatigue, léthargie et changements de comportement, tel qu'être introverti

9



Étourdissement, perte d'équilibre ou de la coordination